

Der Lungenkrebs, die Bergkrankheit in den Schneeberger Gruben.

Ein Beitrag zur Aetiologie der Neoplasmen.
(Mit einer Abbildung.)

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des Herrn

PROF. D^R. BOLLINGER

der

hohen medicinischen Facultät zu München

vorgelegt

von

Richard Ancke,

approb. Arzt aus Chemnitz in Sachsen.

München 1884.

Kgl. Hof- & Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Der Lungenkrebs, die Bergkrankheit in den Schneeberger Gruben.

Ein Beitrag zur Aetiologie der Neoplasmen.
(Mit einer Abbildung.)

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
in der
Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe
unter dem Präsidium
des Herrn
PROF. DR. BOLLINGER
der
hohen medicinischen Facultät zu München
vorgelegt
von
Richard Ancke,
approb. Arzt aus Chemnitz in Sachsen.

München 1884.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Meinem lieben guten Vater

und

dem Andenken

meiner theuren, unvergesslichen
seligen Mutter

in dankbarster kindlicher Verehrung

gewidmet.

„Wenn es irgend ein Kapitel in unserer Wissenschaft giebt, das in tiefes Dunkel gehüllt ist, so ist dies die Aetiologie der Geschwülste“

Mit diesen leider nur allzuwahren Worten beginnt Cohnheim in seinen Vorlesungen über allgemeine Pathologie den Abschnitt über die Aetiologie der Neubildungen.¹⁾

Und in der That, wenn wir absehen von denjenigen Tumoren, die wir Infektionsgeschwülste nennen und deren Aetiologie sich von selbst ergibt und wenn wir den in seiner Ur-fache ganz vereinzelt dastehenden endemischen Kropf gewisser Gegenden vernachlässigen, so müssen wir auch heute noch eingestehen, daß wir über die Aetiologie der Geschwülste κατ' ἐξοχήν nichts wissen, sofern man überhaupt unter dem Ausdrücke „wissen“ ein wirkliches, begründetes Wissen und nicht bloß geistreiche Hypothesen versteht.

Die Frage über die Aetiologie der Neoplasmen hat zu allen Zeiten den denkenden Arzt beschäftigt, und es sind deshalb auch im Laufe der Jahrhunderte mancherlei Theorien aufgestellt worden, die immer miteinander das Eine gemeinsam hatten, daß sie früher oder später als nicht brauchbar erkannt und bei Seite gesetzt wurden.

In den ältesten Zeiten, als selbst der Arzt nicht frei von religiösem und sonstigem Aberglauben war, half man sich, indem man den Hexen und anderen bösen Geistern die Fähigkeit

¹⁾ Cohnheim, Vorlesungen über allg. Pathologie, Berlin 1877. Band I. S. 631.

zuschrieb, daß sie durch den „bösen Blick“, durch körperliche Berührung, durch Gifte oder auf einem anderen möglichst absurden Wege, denen, welchen sie übel wollten, allerlei entstellende und vernichtende Gewächse anzaubern könnten.

Selbst bis in spätere Jahrhunderte kamen die Aerzte betreffs der Urfachen für die Entstehung von Tumoren nicht aus dem Aberglauben heraus, wenn derselbe auch eine weniger plumpe und mehr gelehrte Form angenommen hatte: die älteren Aerzte behaupteten nämlich, daß nervöse Zustände aller Art, daß heftige Gemüthsaffekte, wie Schmerz, Zorn, Scham, Wuth im Stande seien, das Entstehen einer Geschwulst herbeizuführen und sie glaubten dabei vielleicht allen Ernstes, daß diese Erklärung wissenschaftlich genügend sei.

Der erste Anfang eine plausible Aetiologie aufzustellen, wurde von den Neuropathologen gemacht, welche sagten, daß in Folge irgend welcher Störung an den Nerven einer bestimmten Körperregion die durch Nerveneinfluss regulirte Anbildung des Nährmaterials zu Organtheilen und Einschmelzung der abgenützten Gewebelemente gestört werde und nun irgend ein Zellenkomplex dieser Körperregion in nicht mehr zweckentsprechender Weise sich vermehre und zur Geschwulst heranwuchere. Schröder van der Kolk¹⁾ war derjenige, der diese Theorie an der Hand von Experimenten am glücklichsten und geistreichsten vertheidigte.

Einer anderen Anschauung huldigten die Humoralpathologen, welche es sich infofern leicht machten, als sie die Entstehung eines Tumors bei irgend einer Person einfach auf eine bestehende individuelle Diathese schoben. Sie vergaßen dabei, daß sie zwar damit die an Geschwülsten Erkrankten in ihrem pathologischen System untergebracht, daß sie aber eine Ursache für die Erkrankung selbst nicht angegeben hatten.

Noch mancher ungeschickte Versuch zur Erklärung der Urfachen für Geschwulstbildung wurde gemacht; wie sehr aber

¹⁾ Virchow, die krankhaften Geschwulste, Berlin 1863. I. Band. S. 61.

die Pathologen selbst von der Schwäche dieser mannigfaltigen Theorien überzeugt waren, erhellt z. B. aus dem Umstande, daß Schuh in seinem Werke über die Neubildungen¹⁾ die Aetiologie der Geschwülste gar nicht bespricht. Inzwischen aber hatte die junge Medicin, wie sie im I. und besonders im II. Viertel dieses Jahrhunderts aufgeblüht war, sehr wohl die Bedeutung der angeregten Frage für Diagnose, Prognose, Prophylaxe und Therapie erkannt und war rastlos bemüht gewesen, möglichst viel verwerthbares Material zu sammeln, und so konnte es Virchow in seinem classischen Werke über die Geschwülste²⁾ unternehmen, dieser Frage auf Grund bedeutender Erfahrung und exakter Forschung wieder näherzutreten.

Es würde hier zu weit führen, die genialen Auseinandersetzungen des genannten Autors auch nur in Umrissen zu skizziren, es genügt anzuführen, daß insoferne ein bedeutender Schritt gethan wurde, als Virchow erstens die Infektiosität der Geschwülste, die lange Zeit hindurch besonders von W. Müller behauptet worden war, leugnete und sodann unter Anerkennung gewisser durch die Erfahrung festgestellter begünstigender Momente (Lebensalter, Heredität u. f. w.) den Satz aufstellte, es müsse zwar eine locale Disposition (bezogen auf einen Körpertheil oder auf ein ganzes System) für eine Geschwulstbildung vorhanden sein, dies genüge aber zur Entstehung des Tumors noch nicht, sondern es müsse auch — wenigstens in den meisten Fällen — ein Reiz, sei er nun einmalig (Trauma) oder langdauernd (Irritation), sei es chemisch, thermisch oder mechanisch auf die betreffende disponirte Partie eingewirkt haben, damit eine Geschwulst entstehe. Um in dieser Theorie die Lücke zu füllen, die für jene Tumoren bestanden hätte, deren Standort einem äußern Reiz bestimmt nicht zugänglich war, stellte Rindfleisch seine Theorie von

¹⁾ Schuh, Pathologie und Therapie der Pseudoplasmen, Wien 1854.

²⁾ Virchow, die krankhafte Geschwulst, Berlin 1863.

den inneren Reizen¹⁾ auf, indem er sagte, daß durch abnorme Entstehung resp. abnorme Entfernung bestimmter noch unbekannter Umsetzungsprodukte des Organismus für diesen am Orte jenes Umsatzes ein innerer Reiz gegeben würde, der zur Entstehung eines Tumors die Veranlassung gäbe.

Billroth acceptirte die Virchow'sche Ansicht und sprach sie noch unbeschränkter aus²⁾: „die Gewächse entstehen wie die entzündliche Neubildung in Folge von Reizung der Gewebe.“ Er stimmt nur insofern mit Virchow nicht überein, als es für ihn eine spezifische locale Disposition zur Geschwulstbildung nicht giebt, und er diese scheinbar locale Disposition einer allgemein bestehenden Dyskrasie zuschreibt.

Da trat auf einmal Cohnheim mit einer ganz neuen überraschenden Theorie an die Oeffentlichkeit.

Zwar hatten schon vor Cohnheim verschiedene Forscher für einzelne Geschwülste Störungen in den ersten Keimanlagen der Frucht angenommen, — z. B. hatte schon Lücke die Teratome und gewisse cytoide Dermoide entwicklungsgeschichtlich erklärt, und Rindfleisch hatte insofern sozusagen den Uebergang zu diesen embryonologischen Ansichten gefunden als er sagte³⁾: „Ich möchte für meine Person die Aufmerksamkeit der Leser auf den Umstand lenken, daß die in ätiologischer Beziehung am meisten räthselhaften Sarkome und Krebse am wenigsten häufig in den mittleren Lebensjahren erscheinen und deshalb mit der Evolutions- und Involutions-Periode des Körpers in nähere Beziehung zu bringen sind.“ Cohnheim aber stützte sich nur auf die Entwicklungsgeschichte und führte die Entstehung sämmtlicher Geschwülste auf gewisse Fehler in der embryonalen Anlage zurück⁴⁾: An irgend einer Stelle bleiben Conglomerate von Keim-

¹⁾ Billroth, die allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie, Berlin 1882. S. 791.

²⁾ Ibidem S. 793.

³⁾ Rindfleisch, Lehrbuch der pathol. Gewebslehre, Leipzig 1878. S. 92.

⁴⁾ Cohnheim, Vorlesungen über allg. Pathologie, Berlin 1877 I, S. 635.

zellen unbenutzt liegen und nachdem das System inzwischen fertig gebildet ist, nachdem das Individuum lange Jahre gesund gelebt haben kann, entwickeln sich jene Zellenconglomerate zu einer Geschwulst. Als das Auffälligste aber bei dieser Theorie Cohnheims, die ja viele Erscheinungen der Geschwulstentwicklung gut zu erklären im Stande ist, erscheint, daß er einfach jedes äußere Moment, jeden Reiz als Urfache der Geschwulstbildung leugnet, und für die Entstehung eines jeden Neoplasma einzig und allein die fehlerhafte embryonale Anlage verantwortlich macht.

So geistreich und geschickt diese Theorie auch von Cohnheim vertheidigt wurde, so war gewiß jener zuletzt angeführte Zusatz nicht das unwesentlichste Moment dafür, daß Cohnheim für seine Ansicht wenig Anhänger fand. Es hatten sich im Laufe der Jahre doch zu viele praktische Erfahrungen dafür gefunden, daß äußerer reizender Einfluß nicht ohne Bedeutung für die Aetiologie, besonders maligner Tumoren sei: die Lippencarcinome der Bauern, welche fortwährend die Unterlippe zwischen den Zähnen und der herabhängenden Tabakspfeife klemmen, die durch Godard zweifellos constatirte Häufigkeit von bösartigen Geschwülsten bei im Leistenkanal retinirten Hoden, die bekannten Schornsteinfegerkrebsse der Engländer und die im Anschluß an die letzteren gemachten Erfahrungen Volkmanns¹⁾ über Tumorbildung an den Genitalien bei Arbeitern in Theer- und Paraffinbranche, die besonders durch Julius Kühn festgestellte Häufigkeit von Neoplasmen an den Genitalien bei Prostituirten und viele andere Erfahrungen der letzten Jahre haben die Richtigkeit der Annahme, daß äußere Reize im Stande seien, die Entstehung maligner Tumoren herbeizuführen, im allerhöchsten Grade wahrscheinlich gemacht. Aber immer nur wahrscheinlich; denn die gemachten Erfahrungen rechneten stets nur mit kleinen Zahlen und waren schon sämmtlich mit der einen Einwendung

¹⁾ Beiträge zur Chirurgie von Rich. Volkmann, Leipzig 1875. S. 370.

anfechtbar, daß es ja ebensoviele und noch mehr Leute giebt, die sich denselben Einflüssen aussetzen und doch gesund bleiben. Es fehlte eben immer noch die eine Erfahrung, daß irgendwo in Folge der Einwirkung eines Reizes nicht nur einzelne Leute, sondern sämtliche, die sich dieser Einwirkung aussetzten, eine maligne Geschwulst acquirirt hätten.

Es war deshalb für diese Frage von der größten Bedeutung und erregte einigermaßen Aufsehen, als nach einigen vorläufigen Mittheilungen¹⁾ die Herren Bergarzt Dr. F. H. Härtling in Schneeberg und Bezirksarzt Dr. W. Heffe in Schwarzenberg, in der Vierteljahrschrift für gerichtliche Medicin und öffentliches Sanitätswesen²⁾ unter dem Titel „Der Lungenkrebs, die Bergkrankheit in den Schneeberger Gruben“ eine Arbeit veröffentlichten, in welcher nicht nur eine bisher unbekannte, ganz typische neoplastische Lungenerkrankung beschrieben wurde, sondern auch für diese Geschwulstbildung eine ganz bestimmte Noxe als aetiologisches Moment beschuldigt wurde, mit der Bemerkung, daß so gut wie Jeder, der sich dieser Schädlichkeit aussetze, die betreffende Geschwulst acquirire. Ueber diese Arbeit, die ziemlich umfangreich ist und besonders die Oertlichkeit, Luftbeschaffenheit, Ventilation u. f. w. sehr eingehend behandelt, werde ich hier, unter Weglassung aller jener hygienischen Untersuchungen nur das in kurzem Auszuge folgen lassen, was pathologisch resp. pathologisch-anatomisch von Interesse ist.

¹⁾ Archiv für klinische Medicin, Leipziger medicinische Gesellschaft, Correspondenzblatt etc.

²⁾ Vierteljahresschrift für gerichtliche Medicin und öffentliches Sanitätswesen, Neue Folge Band XXX: S. 296—309. Band XXXI: S. 102—132, 313—337.

Der Lungenkrebs, die Bergkrankheit in den Schneeberger Gruben,

in welchen neben Wismuth und Nickel besonders Kobalt gefunden wird, ist eine neoplastische Erkrankung der Lunge, der fast jeder Bergmann, welcher fortgesetzt unter Tage arbeitet, zum Opfer fällt, sofern derselbe nicht an einer intercurrenten Krankheit oder durch Unglücksfall zu Grunde geht. Es sind in den betreffenden Gruben durchschnittlich etwa 650 Mann beschäftigt. Es starben davon am Lungenkrebs in den Jahren

1869—1871 : 63 Mann

1872—1874 : 47 Mann

1875—1877 : 40 Mann.

Die stetige Abnahme der Mortalitätsziffer ist wahrscheinlich dem Umstande zuzuschreiben, daß sich die hygienischen Verhältnisse in den Gruben während der genannten acht Jahre bedeutend gebessert haben. Die Zahlen können nach Ansicht der Autoren zwar nur annähernd richtig sein, illustriren aber die Häufigkeit und Perniciosität der Bergkrankheit dennoch zur Genüge.

Die Symptome und der Verlauf der Krankheit:

Da der Lungenkrebs sich als wachsender Tumor von der Lungenwurzel aus gegen die Lunge zu (resp. im Mediaſtinum) entwickelt, so lassen sich die Symptome, die er macht, sehr wohl verstehen. Selten fehlen alle Symptome bis zum Tod oder bleiben, weil sie zu gering sind, dem Patienten oder dem Arzt unbemerkt. Ein plötzlicher resp. ziemlich schneller Tod kann durch Arrodirung eines größeren Astes der arteria pulmonalis durch die Geschwulst resp. in Folge der rapiden Entwicklung eines colossalen sekundären Leberkrebses eintreten.

Selten consultiren die Erkrankten frühzeitig den Arzt und klagen dann über Beschwerden, die zur Diagnose „Bronchial-

catarrh¹⁴ passen. Verdächtig ist jetzt höchstens die auffallende Blässe der Haut. Diese Blässe nimmt dann im weiteren Verlaufe der Krankheit zu, die Kranken werden dann bleichgelb, selten erdfahl. Haut und Muskel atrophiren, und die Nägel krümmen sich krallenförmig. Da der Tumor, sofern er gröfser wird, auf die vena cava descendens drückt, so treten die Venen an Hals und Brust, sowie an den Armen, besonders auf der erkrankten Seite deutlich hervor, und die betreffenden Partien sind oftmals ödematös geschwollen.

Der Tumor, der peribronchial in die Lunge hineinwächst, verdrängt und comprimirt dieselbe mehr oder weniger. In Folge der Reizung, die das Neoplasma setzt, entstehen pleuritische Adhäsionen und Exsudate auf der erkrankten Seite, welche mit zur Compression resp. Atelektase der Lunge beitragen. Die Lunge wird mehr und mehr durch den wachsenden Tumor nach hinten oder hinten oben gedrängt, und klinisch findet man dementsprechend eine mehr oder minder ausgeprägte absolute Dämpfung von der Mitte der scapula nach abwärts und über dieser Dämpfungszone eine mehr gedämpft tympanitisch schallende Partie. Das Athemgeräusch ist constant auf der erkrankten Seite abgeschwächt. Mitunter ist es vesiculär, mitunter bronchial, und ab und zu hört man Rasseln, bronchitische Geräusche und wenn auch selten, cavernöses Athmen. Ein sehr auffälliges Symptom ist das zuweilen auftretende und nach einiger Zeit wieder verschwindende Trachealrasseln. — Gegen das Ende der Krankheit erstreckt sich meist die absolute Dämpfung über die ganze Thoraxhälfte, und Athemgeräusche sind in Anbetracht des Umstandes, dafs die ganze Lunge nunmehr total verödet ist, nicht mehr nachzuweisen. In einzelnen Fällen, wenn der Tumor sich im Mediastinum anticum ausbreitet, ist man auch im Stande ihn an einer längs des Sternum verlaufenden Dämpfung zu erkennen.

Die Intercosträume sind fast immer paralytisch, zuweilen erscheinen sie auch durch pleuritiches Exsudat vorgebuchtet.

Die gesunde Lunge bleibt oft lange Zeit intakt (unwahrscheinlich, da sich bei der schweren Arbeit der Grubenleute wohl meist vicariirendes Emphysem einstellen wird. D. V.), in späteren Stadien aber findet man oft Bronchialkatarrh oder Pleuritis.

Was die einzelnen Beschwerden anlangt, so ist stechender, bohrender Brustschmerz ein fast constantes Symptom. Später sind oft die Thoraxwandungen allgemein empfindlich, oder der Schmerz entspricht einer circumscribten Pleuritis.

Auswurf fehlt nur in seltenen Fällen bis zum Tode, lange Zeit wird meist nur ein dem Speichel ähnlicher Schleim expectorirt, im weiteren Verlaufe zeigt das Sputum aber mitunter eine charakteristisch ziegelrothe Färbung, die in der Beimischung von hellem Blut (wahrscheinlich aus der Trachea und den grossen Bronchien, die durch den Tumor arrodirt werden) ihren Grund hat. Selten wird reines Blut von dunkler Farbe ausgeworfen. Ein typisches Fieber fehlt dabei und das Blutspucken bringt dem Patienten eine subjektive Erleichterung.

Gelber oder grünlicher, übelriechender oder jauchiger Auswurf kommt nur bei Complicationen (eitrige Bronchitis, Krebscavernen, Bronchiektasien) vor.

Gesteinstaub läßt sich im Sputum nicht nachweisen.

Bedeutendere, den Tod sofort herbeiführende Lungenblutungen sind sehr selten.

Die Dyspnoë ist von vornherein ziemlich beträchtlich und wächst mit dem Fortschritt der Erkrankung progressiv, so daß sie das quälendste Symptom bildet.

Appetit und Verdauung sind wenigstens zeitweilig, meist aber dauernd gestört, Verstopfung ist gewöhnlich, Erbrechen häufig (durch den anhaltenden Hustenreiz bedingt). Schlingbeschwerden entstehen nicht selten durch Druck des Tumors auf den Oesophagus.

Die Dauer der Krankheit von da an, wo sie zur ärztlichen

Kenntniß gelangt bis zur Auflösung, die allmählig durch hochgradigen Marasmus erfolgt, beträgt $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ Jahr.

Anatomischer Befund:

An der Hand von 20 Sektionen, die vorgenommen wurden, läßt sich folgender Durchschnittsbefund aufstellen: Die Leiche ist mehr oder minder, zuweilen hochgradig abgemagert, die Hautdecken sind von bleicher oder bleichgelber, selten erdfahler Farbe, meist trocken und dürr, selten ödematös und dann besonders an den oberen Extremitäten, an Hals und Gesicht. An den unteren Extremitäten sind meist nur die Füße ödematös. Selten findet man Anasarka und hydropische Ergüsse in den serösen Höhlen.

Die Hautvenen, besonders an der oberen Thoraxhälfte, sind meist stark gefüllt, die sichtbaren Schleimhäute bleich oder etwas livid, die Nägel sind fast immer klauenförmig gekrümmt. Der Thorax zeigt entsprechend dem Grade des Marasmus mehr oder minder paralytische Intercosträume, selten aber ist die erkrankte Brusthälfte erheblich vorgebuchtet.

In der Pleurahöhle der erkrankten Seite findet sich regelmäßig ein pleuritischer Erguß (1 — $1\frac{1}{2}$ Liter gelblich klarer, selten blutig tingierter Flüssigkeit), öfter auch zahlreiche Adhäsionen der Pleurablätter bis zur totalen Verwachsung und ebenfolche zwischen den einzelnen Lungenlappen. Stets aber finden sich auf der kranken Seite feste pleuritische Verwachsungen an der Lungenwurzel.

Die kranke Lunge ist stets beträchtlich verkleinert und liegt mitunter bis zur Größe von 2 Fäusten reducirt hinten oder hinten oben. Das Gewebe der Lunge ist verdichtet und sehr wenig lufthaltig.

In den meisten Fällen fand sich der Krebs nur einseitig als taubenei- bis faustgroße Geschwulst an der Lungenwurzel und es zeigte sich, daß es sich peribronchial mehr weniger weit in die Lunge hinein fortsetzte (zuweilen bis an die Peripherie).

In einem Falle fanden sich kleine, multiple Carcinome

der Bronchialdrüsen, der Lungen, der Pleura mit Uebergang auf das Pericardium, sonst aber in allen anderen Fällen, „bei den regelrecht anfahren den Bergleuten fand sich nur das gewöhnliche Lymphosarkom, das sich nach Art wachsender Tumoren entwickelt.“

In einzelnen Fällen finden sich neben dem Lungenkrebs Krebse in der Pleura, in gröfser Anzahl, als linfen- bis haselnußgroße Knötchen, über denen die Pleura glatt und glänzend erscheint. Mitunter sieht man auch nur einzelne gröfsere Tumoren, welche die Intercosträume durchbohren resp. die knöcherne Thoraxwand ufrüren können und sich dann als rundliche Geschwülste unter der Haut nachweisen lassen.

Die Bronchialdrüsen sind stets verändert, meist vergrößert, oft melanotisch und dann zuweilen bis wallnußgroß. Auf dem Durchschnitt erscheinen sie, als ob sie aus reiner Kohle beständen, oder sie sind steinhart und knirschen beim Durchschneiden. Sie sind entweder zum Theil oder alle in den Krebstumor aufgegangen, in dessen Durchschnitt man noch ihre pigmentirten Contouren sieht. Hals- und Achselhöhlen sind öfter sekundär ergriffen. Nicht selten finden sich höckerige Hervorragungen in der Trachea und den Bronchien, sowie auf der tunica intima der Gefäße, sobald der Krebs auf die genannten Gebilde übergeht. Mitunter ergreift die Neubildung auch das Pericardium und erzeugt häufig Adhäsionen zwischen dem visceralen und parietalen Blatt, seltener beträchtlichen Erguß in die Herzbeutelhöhle.

Die Leber ist sehr oft der Sitz sekundärer Tumoren, sie ist dann colossal vergrößert und von zahlreichen, erbsen- bis wallnußgroßen, ja selbst faustgroßen gelblichen Tumoren durchsetzt.

Sonstige constante Veränderungen anderer Organe, die in einen genetischen Zusammenhang mit dem Lungenkrebs sich bringen ließen, wurden nicht aufgefunden.

Die Krebse in der Lunge waren immer die älteren, die

in anderen Organen immer die später entstandenen; nicht selten fand sich nur der Lungenkrebs, niemals wurden Tuberkel in der Lunge nachgewiesen.

Die Therapie richtet sich rein symptomatisch gegen die lästigen Symptome: Dyspnoe, Schmerzen, Husten, Schlaflosigkeit. Gegen Erbrechen wurde Condurango zuweilen mit Erfolg gegeben. Gegen die der Krebsbildung oft vorangehende Anämie wurde Eisen in Form des *extractum mali ferratum* angewendet.

Da nun in den Schneeberger Gruben in einem trockenen Gestein gearbeitet wird und speziell trocken gebohrt wird (oder wenigstens wurde), so ist die Athmosphäre in den Gruben so bedeutend staubhaltig, daß sie Jeden, der nicht daran gewöhnt ist, zum Husten reizt.

Es war also a priori schon anzunehmen, daß man es hier mit einer Staubinhalationskrankheit zu thun habe, und es wurden deshalb von den Autoren eingehende Untersuchungen über den Kohlen säuregehalt der Luft in den verschiedenen Schächten, über Ventilation, Gehalt der Luft an Staub, Menge des mit der Athmung pro Stunde und Schicht aufgenommenen Staubes und chemische Beschaffenheit dieses Staubes vorgenommen. Abgesehen nun von einigen interessanten Thatfachen, die aber nur für den Hygieniker von Belang sind, fand sich, daß die Menge des pro Stunde resp. pro Schicht (7 stündig) aufgenommenen Gesteinstaubes eine ungemein große war (die verschiedenen Untersuchungen gaben recht verschiedene Zahlen je nach der Untersuchungsmethode. — Auffangen des Staubes mit Wachspapier, Auffangen des Staubes in einer mit Watte gefüllten Trockenröhre, die der Arbeiter an der Brust trägt, Auffangen des Staubes mittelst Respiratoren — aber selbst die niedrigste Zahl weist eine immense Staubmenge auf) und es ergab die chemische Analyse der verschiedenen Staubproben, die bei 100° C. getrocknet waren.

51,00	Kieselfäure	
14,65	Thonerde	
7,50	Eisenoxydul	
12,85	Kalkerde	
3,30	Magnesia	
0,19	Arfenik	} Speiskobalt
0,08	Kobaltnickel	
9,80	Glühverlust	
99,27.		

Es bestand also der Staub aus einem Gemisch von Glimmerschiefer und Thonschiefer mit einer geringen Menge von Speiskobalt.

Ferner wurden an verschiedenen Stellen in den Gruben auf je einen in der Mitte eines frei aufgestellten Objektträgers befindlichen Tropfen Kanadabalsam Staubpartikel aufgefangen und an Ort und Stelle unter Deckgläschenverschluss gebracht. Die mikroskopische Untersuchung verschiedener solcher Präparate ergab, daß je nach dem Fundort Splitter verschiedener Größe sich fanden, die jedoch stets kleiner waren, als die im Bohrmehl selbst befindlichen, und je härter und quarzreicher das Gestein war, desto scharfkantiger und spitziger waren diese Splitter, so daß sie Aehnlichkeit mit makroskopischen Glascherben hatten. Da jedoch bei Inhalation eines nicht minder reichlichen, scharfkantigen und spitzen Staubes die uns interessirende Krankheit nicht entsteht, so ist der mechanischen Wirkung (Reizung) desselben kein hervorragender Einfluss zuzuschreiben.

Von den angestellten Untersuchungen über sonstige Verunreinigung der Luft sei hier nur angeführt, daß im Allgemeinen die Bergleute einer reinen frischen Luft während ihres Aufenthaltes in der Grube durchaus entbehren.

Da in den Gesteinproben aus allen möglichen, auch nicht erzhaltigen (tauben) Parteen der Schneeberger Gruben Speiskobalt, wenn auch mitunter nur in geringer Menge gefunden

wurde, so ist anzunehmen, daß selbst Bergleute, die nur im Quergestein arbeiten und nicht Gangarbeit verrichten, täglich mehrere Milligramm arsenhaltigen Speiskobalt inhaliren und dass so auf einem predisponirten Boden ein constanter Reizzustand unterhalten wird, der schließlich zur Entstehung des Lungenkrebses Veranlassung wird. Es erklärt sich auf diese Weise, daß eine so lange Reihe von Arbeitsjahren nothwendig ist in Entstehung des Tumors. Es erklärt sich so, daß früher, wo noch weit mehr Erz gefunden wurde, die Leute ein höheres Alter erreichten, und die Krankheit seltener auftrat: denn abgesehen von dem damals besseren Ertrag und der in Folge dessen kürzeren Arbeitsdauer konnten Vergiftungserscheinungen immer nur akut auftreten und zwangen dann die Leute einfach, von der Arbeit abzusteigen. Ungezwungen erklärt es sich auch hieraus, daß die Häuer, also die vor Ort Arbeitenden, am häufigsten und frühesten erkranken, daß aber die Zimmerlinge, Maurer und andre Personen, die dem Gesteinstaub weniger ausgesetzt sind, bei Weitem älter werden und seltener und später als jene, aber dennoch erkranken.

Ferner wurde noch die eigenthümliche Beobachtung gemacht, daß die meisten Bergleute nach verhältnißmäßsig geringer Anstrengung eine enorm hohe Puls- und Respirationszahl darbieten, daß diese Zahlen dann bei Eintritt der Ruhe sehr schnell fallen, aber nur bis zu einer gewissen durchschnittlich abnormen Höhe (Puls 90—120). Nur eine geringe Anzahl von Bergleuten hatten überhaupt eine normale Puls- und Respirationstrequenz, und diese waren es, die sich selbst ausdrücklich für ganz gesund erklärten.

Die Bergarbeiter leben übrigens in den traurigsten Verhältnissen. Der Lohn ist sehr gering, die Ernährung und Wohnung unzureichend, die Gemüthsstimmung in Folge der Verhältnisse und in Aussicht des qualvollen, tödtlichen Leidens eine sehr düstere. Dabei sind die Leute sehr bescheiden und genügsam, speciell werden Alkoholika auffallend wenig genossen.

Es folgen dann die einschlägigen hygienischen Vorschläge zu möglichster Abhaltung der Schädlichkeit.

Auf Grund des Mitgetheilten werden folgende 6 Sätze als **Endergebnis formulirt**:

1. Die in den Gruben bei Schneeberg endemisch vorkommende Bergkrankheit ist primärer Lungenkrebs, und circa 75% der Todesfälle kommen auf ihre Rechnung.

2. Die Krankheit tritt auf als Lymphosarkom oder in sehr seltenen Fällen als Endothelcarcinom; beide Formen gehören zusammen und gehen stets von den Bronchiallymphdrüsen aus.

3. Alle hiesigen Grubenarbeiter, welche nicht verunglücken, oder so zu sagen durch eine intercurrente Krankheit hinweggerafft werden, gehen schließlich an Lungenkrebs zu Grunde.

4. Der Eintritt der Krankheit erfolgt frühestens nach 20 jährigem Anfahren, meist später, selten erst nach 30jähriger Thätigkeit in der Grube.

Vorwiegend schnell erkranken die Hauer namentlich wenn sie anhaltend Gangarbeit verrichten, am spätesten die Bergmaurer und Bergzimmerlinge, die nicht anhaltend einfahren und zeitweilig (im Sommer) Urlaub bekommen.

5. Prädisponirende Momente sind: Allgemeiner Tiefstand der Ernährung, vor Allem vorausgegangene Brustkrankheiten, Lungen- und Pleuraentzündungen mit Verödung von Lungengewebe, sowie Ueberlastung der Lunge durch körperliche Anstrengungen, insbesondere die Fahrt, mit consecutiven Emphysem. Die Erblichkeit kann nach angestellten Untersuchungen als prädisponirendes Moment nicht gelten.

6. Die direkt schädigende Ursache ist das Arsen, welches in seinen hier vorkommenden, nicht schwefelhaltigen Verbindungen (besonders als Speiskobalt) inhalirt durch die praformirten Stomata in den Lymphstrom und durch diesen in die Bronchialdrüsen gelangt, und hier eine permanente chemische Reizung

veranlaßt, welche schliesslich zur Sarkomatösen Entartung der einen oder der andern Drüse führt.

Zur Begründung des letzten Satzes No. 6 wird noch angeführt:

Die in den hiesigen Gruben vorhandenen Schädlichkeiten sind in gleicher oder ähnlicher Weise auch in anderen Gruben vorhanden, mit Ausnahme der Metalle, von Wismuth, Nickel und Kobalt ist eine stark reizende Wirkung bis jetzt wenigstens nicht bekannt. während der Arsenik diese Eigenschaften in hohem Grade besitzt. In anderen Gruben kommt der Arsenik in Verbindung mit Schwefel vor, eine fast unlösliche und deshalb ziemlich unschädliche Verbindung, in den Schneeberger Gruben aber kommt er im Speiskobalt mit Kobalt verbunden vor, und dieser Speiskobalt, während er die Luftmenge größtentheils unzersetzt paßirt, zersetzt sich in den Bronchialdrüsen und erregt so durch Freiwerden des scharfen Arsens eine dauernde Reizung. Dafs die Erkrankung in anderen Bergwerken, wo ebenfalls Arsen mit in Frage kommt, nicht bekannt ist, liegt erstens daran, dafs das Arsen dort in unschädlicheren Verbindungen auftritt und zweitens daran, dafs die Art des Abbaues eine total andre ist.

Dies in Kürze das Ergebnifs der pathologischen und pathologisch-anatomischen Untersuchung der genannten Autoren.

Wenn nun an sich schon die hiergeschilderte Krankheit mein Interesse in Anspruch nehmen mußte, da es sich diesmal um ein greifbares aetiologisches Moment für Geschwulstbildung handelte, so forderte gewissermaßen ein glücklicher Zufall mich auf, der im Auszug mitgetheilten Veröffentlichung der H. H. Härtling und Hesse etwas näher zu treten. Herr Dr. Hesse hatte nämlich die Freundlichkeit dem pathologischen Institut zu München ein Präparat dieses Lungenkrebses zu übersenden, und ich erbat mir deshalb von Herrn Prof. Dr. Bollinger die Erlaubnifs, das genannte Präparat genauer mikroskopisch untersuchen zu dürfen.

Da nun bisher nur wenige Fälle eingehend mikroskopisch untersucht wurden, so hielt ich es für der Mühe werth, das uns zugeschnittene Präparat genauer auf seine histologische Beschaffenheit zu prüfen und theile im Folgenden meine Ergebnisse mit:

Makroskopischer Befund:

Das Präparat, welches schon geraume Zeit in Alkohol liegt, besteht aus einem unregelmässig gestalteten Conglomerat von Geschwulstknoten, ferner aus einem kleinen Stück der anliegenden Lunge und endlich aus einigen nur zufällig darangebliebenen Stücken Bindegewebe, Pleura, Oesophagusmuskulatur u. s. w. Aus den eben genannten zufälligen Anhängeln und aus der Grösse der dem Tumor anliegenden Aeste der art. pulmonalis erkennt man, dass die Geschwulst aus dem hinteren Mediastinum von dem Hilus der Lunge stammt.

Die Geschwulstmasse besteht zunächst aus einem grössern Tumor, der etwa die Ausdehnung eines sehr kleinen Hühner-
eies besitzt. Dieser grössere Tumor fühlt sich mässig hart an und hat eine grob-höckerige Oberfläche von unregelmässiger Gestalt und graugelber Farbe. Er ist auf der einen Seite mit dem vorhandenen Stück Lunge innig verwachsen, auf der anderen Seite ist er dem erhaltenen und stark verdickten Stück Pleura ziemlich fest adhärent. Auf dem Durchschnitt zeigt die Geschwulst etwas schwammiges Gefüge und ist, augenscheinlich entsprechend den praexistenten Lymphdrüsen, in mehrere Abtheilungen, welche ungefähr die Grösse einer kleinen Haselnuss haben, zerklüftet. In der Mitte dieser Abtheilungen sieht man als Reste der in den Tumor aufgegangenen Bronchialdrüsen bläulich-schwarzes Pigment abgelagert. Der Durchschnitt bietet im Allgemeinen denselben Farbenton wie die Oberfläche, nur etwas heller. Auch auf dem Durchschnitt erkennt man, dass der grössere Tumor mit dem erhaltenen Stück Lunge fest und unlöslich verwachsen ist, jedoch ist die Grenze zwischen Geschwulst und Lunge eine sehr scharfe und

gleicht fast einer graden Linie. Auf der dritten Seite hängt der Tumor durch ziemlich straffes, theilweise aus Geschwulstmasse bestehendes Gewebe mit dem zweiten Tumor zusammen, der ungefähr die Grösse eines Taubencies besitzt und im Uebrigen, d. h. sowohl was Gefüge und Consistenz, als auch was Oberfläche, Farbe und Durchschnitt anlangt dem ersteren völlig gleicht. Ausserdem lassen sich in mehr oder wenig festem Zusammenhang mit den beiden grösseren Tumoren noch einige kleinere, von der Grösse einer Erbse bis zur Grösse einer Haselnuss nachweisen, welche auf den ersten Blick als entartete Bronchialdrüsen imponiren und in jeder Beziehung den beiden grösseren Geschwülsten gleichen. Die Tumoren sind alle circumscript, und, abgesehen von einem über rabenfederkiel-dicken Zweig der Pulmonalis, welcher in dem zweitgrössten Tumor wie eingemauert erscheint, ohne dass die Aterie sonstige Veränderungen darbietet, hat die Neubildung sich nicht auf irgend welche andre Organe erstreckt, soweit sich dies aus dem vorliegenden Präparat erkennen lässt. Neben den neoplastisch erkrankten Drüsen lassen sich andere, intakte Bronchialdrüsen nicht nachweisen.

Das kleine, etwa kinderfaustgrosse Stück Lunge, welches an dem Präparat erhalten ist, erscheint auf der Oberfläche gleichmässig bläulich-schwarz und lässt noch Fetzen von einer adhären ten verdickten und getrübbten Pleura costalis erkennen. Das Lungengewebe fühlt sich etwas consistent an, ist dabei aber noch ziemlich lufthaltig; auf dem Durchschnitt zeigt es deutliches alveoläres Gefüge und dieselbe Farbe wie die Oberfläche, nur mit grauen Partien untermengt. Eine Neubildung lässt in dem vorhandenen Stück Lunge wenigstens mit bloßem Auge nicht nachweisen.

Mikroskopischer Befund:

Die mikroskopische Untersuchung wurde an vier Stücken vorgenommen. Das erste Stück wurde der vorhandenen Lunge entnommen, das zweite Stück stammt von der Grenze zwischen

Geschwulst und Lunge, das dritte Stück ist von einer Stelle des kleineren Tumors, wo daselbe makroskopisch ein möglichst homogenes Aussehen darbietet, als viertes Stück wurde von dem größeren Tumor eine derjenigen Stellen untersucht, welche durch ihre Pigmentirung ihre direkte Abstammung von den präexistenten Bronchialdrüsen verrathen.

Diese Stücke wurden, da sie sich wegen ihres spongiösen Gefüges unter Alkohol nicht in der gewünschten Weise schneiden ließen, durch permanente Wasserirrigation (24 Stunden) von Alkohol befreit und dann auf dem Katsch'schen Gefrier-mikrotom geschnitten.

Es wurden sodann verschiedene Färbungen: mit Alauncarmin, Vesuvin, Haematoxylin, Eosin sowie Doppelfärbungen mit wässerigem Haematoxylin und alkoholischem Eosin vorgenommen, und die Schnitte zuletzt nach Aufhellung in Nelkenöl in Canadabalsam eingelegt und untersucht.

Das Lungenpräparat bietet das Bild eines geringgradigen Emphysems, die Anthracose ist deutlich ausgesprochen, insofern jedoch von dem gewöhnlichen Befunde abweichend, als nur wenig größere Pigmentpartien, dafür aber eine unzählbare Menge kleinster, eben mit mittlerer Vergrößerung noch sichtbarer schwarzer Partikelchen in den interalveolären und etwas verbreiteten Leisten nachgewiesen wurden. Metastatische Geschwulstherde oder sonstige Anomalien lassen sich nicht finden. — An dem zweiten Präparat erkennt man, daß der Tumor auch mikroskopisch sich scharf gegen das gesunde Lungengewebe abgrenzt und keinerlei Ausläufer in letzteres hineinschickt. Die trotz alledem sehr straffe Verbindung ist durch fibröses, derbes Gewebe hergestellt. — An dem dritten und vierten Präparate, welche daselbe Bild darbieten mit dem einzigen Unterschied, daß sich in Präparat IV im bindegewebigen Gerüste der Geschwulst anthrakotisches Pigment findet, erkennt man Folgendes:

Die Geschwulst zeigt ein ausgeprägt alveoläres Gefüge.

Das Gerüste, welches die Alveolen bildet, besteht aus einem breiten mässigen Gewebe, das an den meisten Stellen den Charakter des wahren Bindegewebes darbietet, an manchen Stellen aber vorwiegend aus Spindelnzellen besteht und wieder an anderen theils bindegewebig, theils Sarkomatös erscheint. Diese Gerüstbalken sind überall mehr oder weniger mit Rundzellen durchsetzt und enthalten an vielen Stellen auch deutlich an den langen stabförmigen Kernen erkennbare glatte Muskelfasern, die, wie sich an einzelnen gut gelungenen Schnitten evident nachweisen lässt, von der *muscularis* der den Tumor durchsetzenden Gefäße abstammen. Die alveolären Räume, welche durch diese Gewebsbalken in ziemlich ungleichmässiger Form und Grösse gebildet werden, sind mit dicht aneinander liegenden Rundzellen, die sich alle mit Haematoxylin sehr gut färben, gefüllt. Diese Rundzellenconglomerate werden in den Alveolen durch ein nur theilweise noch zu erkennendes sehr feines bindegewebsartiges Reticulum an manchen Stellen in ihrer Lage erhalten, die meisten Alveolen aber erscheinen trotz der sorgfältigsten Behandlung der Präparate nur noch unvollständig mit diesen Rundzellen erfüllt. — Bei Doppelfärbung mit Haematoxylin und Eosin wird die an den meisten Stellen doch mehr bindegewebige, als Sarkomatöse Natur der interalveolären Balken sehr schön durch die rothe Färbung derselben erkannt, welche gegen die tief dunkelblaue des Alveoleninhalts scharf absteht.

Nirgends findet man Zeichen einer regressiven Metamorphose, die Färbemittel sprechen überall an, und weder Hämorrhagien, noch fettige Degeneration, noch Zelltod können an irgend einer Stelle nachgewiesen werden.

Mikroorganismen lassen sich selbst mit *Immerision Hartnack IX.* nicht auffinden. (Allerdings ist das Präparat nicht frisch, sondern, wie schon erwähnt, in Alkohol conservirt.) Der Tumor enthält also zwar alle zelligen Bestandtheile des Organs, dem er entstammt, also der Bronchialdrüsen (Bindegewebe, Lymph-

zellen, Muskelfasern), ist aber entschieden als einfache Hypertrophie oder Hyperplasie der Drüsen nicht aufzufassen. Dagegen spricht zunächst die gänzlich atypische, histologische Bauart der Geschwulst, ferner aber auch klinisch die große Malignität und der Umstand, daß in anderen Organen, wie z. B. in der Leber Metastasen vorkommen, die ja bei Hypertrophie oder Hyperplasie nicht recht zu verstehen wären.

Aber auch der etwaige Einwand, daß man es mit einer Lymphadenitis chronica fibrosa (s. indurativa) zu thun habe, ist, ganz abgesehen von jenen obenerwähnten Gründen, schon an der Hand der Erfahrung zu widerlegen. Das mikroskopische Bild bei dieser Lymphadenitis ist von dem hier vorliegenden gänzlich abweichend. Orth in seinem Compendium der pathologisch-anatomischen Diagnostik¹⁾ sagt ausdrücklich über diese Form von Lymphdrüsenentzündung: „Es verdickt sich dabei unter faseriger Umwandlung das Reticulum, es verdicken sich Kapsel und Trabekeln, während die lymphoiden Zellen mehr und mehr schwinden.“

Wenn wir also die chronisch fibröse Lymphadenitis und die Hypertrophie resp. Hyperplasie der Drüse nicht für den vorliegenden Fall annehmen können, so kommen wir schon per exclusionem dazu, daß der Tumor ein wahres Pseudoplasma ist, wozu ja auch die klinischen Symptome und der Verlauf der Krankheit passen.

Wollte man nun pathologisch strenge verfahren, so müßte man dieses Pseudoplasma eigentlich eine Mischgeschwulst nennen und ihr einen ziemlich vielfarbigen griechischen Namen geben; wenn man aber von den doch nur in geringer Menge vorhandenen glatten Muskelfasern absieht, so kann man die Geschwulst als ein Lymphom (Lymphadenom) bezeichnen. Die Lymphadenome zerfallen wieder in gutartige (einfach hyperplastisches Lymphom, bei dem die Neubildung die Grenze des

¹⁾ Orth, Compendium der pathologisch-anatomischen Diagnostik nebst Anleitung zur Ausführung von Obduktionen und von pathol. histol. Untersuchungen. Berlin 1884. S. 559.

Organes nicht überschreitet) und maligne Lymphome. Mit letzterem haben wir es hier zweifelsohne zu thun, und zwar, da die zelligen Bestandtheile so sehr überwiegen mit einem farkomatösen Lymphom, oder wie der Sprachgebrauch ist zu sagen, mit einem Lymphofarkom. Für ein legitimes Lymphofarkom aber sind die interalveolären Leisten zu breit und haben zu sehr den Charakter des fertigen Bindegewebes, und so glaube ich, indem ich hinzufüge, daß die Geschwulst nicht an allen Stellen eine congruente histologische Beschaffenheit aufweist, nicht irrezugehen, wenn ich die mikroskopische Diagnose

Lymphosarkoma fibromatodes

stelle.

(Siehe die angefügte Tafel nebst Erklärung.)

Wenn ich nun unter genauer Berücksichtigung der mir vorliegenden Arbeit von Härtling und Heffe und auf Grund der Beobachtung dieses Falles, sowie an der Hand der in der einschlägigen Literatur niedergelegten Erfahrungen einige Bemerkungen anschliesse, so möchte ich diese nicht als eine Kritik der hier besprochenen Arbeit, sondern vielmehr als einen kleinen pathologischen resp. pathologisch-anatomischen Nachtrag aufgefaßt wissen.

Zu den von Härtling und Heffe formulirten 6 Schlüssen habe ich folgendes zu bemerken: da sich die Sätze 3, 4 und 5 aus der Arbeit selbst ergeben, so habe ich nur zu Satz 1 und 2 und zu Satz 6 hinzuzufügen:

ad. 1 und 2. Wenn im Satz 1 die Diagnose primärer Lungenkrebs und im Satz 2 die Diagnose Lymphofarkom von den Bronchialdrüsen ausgehend aufgestellt wird, so ist dieser scheinbare Widerspruch wohl so zu erklären, daß mit dem ersten die mehr grobe makroskopische, mit dem zweiten die feinere pathologisch-anatomische und mikroskopische Diagnose gemeint ist. In dem Fall, den ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, lag jedoch ein einfaches Lymphofarkom nicht vor, sondern eine fibromatöse Abart desselben. Ich vermag natürlich nicht zu unter-

scheiden, ob mein Fall zufällig etwas von dem Durchschnittsbefund Abweichendes darbietet, oder ob die früheren Untersuchungen nur an Zupfpräparaten und mehr cursorisch gemacht wurden.

ad. 6. Was nun den letzten und wichtigsten Satz anlangt, so bin ich, nachdem ich mich in der betreffenden Literatur umgesehen, zu einem etwas anderen Resultat gelangt.

Härtling und Hefse haben Recht, wenn sie sagen, daß der spitze Gesteinstaub nicht sowohl aetiologisch zu verwerthen sei, da eine ähnliche Krankheit bei Leuten, die mit scharfem Gestein- resp. Metallstaub zu thun haben, bis jetzt noch nicht beobachtet wurde. Sie schliesen nun, daß das Arsen die schädigende Ursache sein müsse, und auch in einem privaten Briefe des Herrn Dr. Hefse an Herrn Prof. Dr. Bollinger vom vorigen Jahre, welchen Herr Prof. Bollinger so gütig war mich einsehen zu lassen, bezeichnet Herr Dr. Hefse das im Staube enthaltene Arsen als den „Attentäter.“ Daß die befagte Neubildung nicht auch in anderen Hütten und Werken bei den beschäftigten Arbeitern vorkomme, glauben die HH. Härtling und Hefse dadurch erklären zu können, daß in den befagten Werken das Arsen in einer unschädlichen, weil unlöslichen Verbindung vorhanden sei resp. der Abbau in einer anderen, ungefährlicheren Weise gehandhabt werde.

Ich glaube nun nicht, daß man das Arsen allein beschuldigen kann und zwar habe ich für diese meine Ansicht folgende Gründe:

1. Erstens ist es uns nach den durch Billroth gemachten Erfahrungen bekannt, daß gerade Arsenikpräparate auf maligne Lymphome einen Einfluß in dem Sinne ausüben, daß sich dieselben auffallend schnell zurückbilden, und wenn wir nun annehmen wollten, daß durch eine chronische Arsenikintoxication solche Lymphome auch entstehen könnte, so kämen wir damit auf einen etwas homoeopathischen Standpunkt.

2. Obgleich ich mich in vielen neueren Arbeiten über

Arsenvergiftung¹⁾ umgekehrt habe, so habe ich doch nirgends eine Erwähnung einer durch chron. Arsenikintoxication hervorgerufenen malignen Neubildung gefunden, obgleich doch sicherlich ganz abgesehen von Bergwerken, in Hütten und manchen Industriebranchen (z. B. arsenhaltigen Farben bei der Fabrikation künstlicher Blumen) die Arbeiter giftige Arsenikpräparate mit dem Staube inhaliren. Ich fand nun bei Gies²⁾ und Nothnagel und Rossbach³⁾ die Angabe, dass die Arbeiter in Werken, wo Arsenmetalle verarbeitet werden, oft unter der Erscheinung von Phthise, die hier den Namen „Hüttenkatze“ (*tabes arsenicalis*) führt, zu Grunde gingen. Ich glaubte schon, dass sich diese Angaben insofern für die Ansicht von Härting und Hefse verwerthen ließen, als vielleicht mancher Fall von dieser „Hüttenkatze“ eine ähnliche (wie die hier beschriebene) neoplastische Krankheit gewesen sei und nur fälschlicherweise, weil nicht secirt, für Phthise genommen worden sei, — da fand ich in der deutschen Zeitschrift für Thiermedizin und vergleichende Pathologie⁴⁾ die interessante Angabe, dass Rinder, welche in

¹⁾ Nothnagel und Rossbach, Handbuch der Arzneimittellehre. Berl. 1880. Untersuchungen über Arsenverbindung von H. Schulz und Binz. Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie 11. Bd. III. Heft S. 132, 13. Bd. III. Heft S. 256, 14. Bd. V. Heft S. 345. 15. Bd. V. Heft S. 322.

Die Arsengiftwirkungen vom chemischen Standpunkt betrachtet von Binz und Schulz, Archiv f. exp. Path. und Pharmakologie 11. Bd. III. Heft S. 200.

Dr. Th. Gies, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des Arsens auf den Organismus, Archiv f. exp. Pathologie und Pharmak. 8. Bd. III. Heft S. 175.

²⁾ Ibid. S. 179.

³⁾ Nothnagel und Rossbach, Handbuch der Arzneimittellehre S. 211, Berlin 1880.

⁴⁾ Deutsche Zeitschrift für Thiermedizin und vergleich. Pathologie III. Bd. Abschnitt XXVIII. S. 414.

Hauber, Med.-Rath, Vortrag in der Gesellschaft f. Naturheilkunde am 8. April 1876. (Aus dem Jahrbuche dieser Gesellschaft, Dresden 1876):

der Nähe von Arsenikwerken (bei Freiberg in Sachsen), die mit Arsenstaub („Hüttenrauch“) bedeckten Pflanzen abweiden an echter Phthise zu Grunde gehen und glaube daraufhin doch auch jene „Hüttenkatze“ für echte Phthise ansehen zu müssen.

3. Wenn die Arseneinwirkung thatsächlich eine genügende ist, um eine maligne Geschwulstbildung hervorzurufen, so mußten sich doch irgendwelche, wenn auch noch so geringgradige Symptome chronischer Arsenicose auffinden lassen. Ich finde aber, soweit sich dies aus den in betreffender Arbeit gemachten Angaben entnehmen läßt, nichts davon, und auch die hohe Puls- und Respirationsziffer läßt sich wohl kaum in diesem Sinne deuten, sondern ist nach meiner Ansicht als ein Symptom der allgemeinen Cachexie aufzufassen.

Da nun das Arsen nicht allein im Stande ist, die Entstehung der beschriebenen Neubildung zu erklären, da auch Mikroorganismen, welche vielleicht endemisch vorkommend die eigenthümliche Erkrankung erzeugen könnten, actiologisch nicht verwerthet werden können, erstens insofern sie weder von Hesse (briefl. Mittheilung an H. Prof. Bollinger) noch von mir aufgefunden werden konnten und zweitens, insofern die Richtigkeit dieser Aetiologie vorausgesetzt auch noch andre Leute in dieser Gegend, die nicht gerade mit dem Gesteinstaub in Berührung kommen, erkranken müßten, was notorisch nicht der Fall ist, da ferner Erblichkeit ebenfalls ausgeschlossen ist, so muß man, um eine Ursache für die Bergkrankheit zu finden, doch wieder zu dem inhalirten Gesteinstaub zurückkehren, noch dazu, weil die in Satz 4 niedergelegten exakten Erfahrungen entschieden für die Bedeutung dieser Noxe sprechen.

Ich glaube nun, daß in der That dieser Staub als der schuldige Theil angesehen werden muß und zwar nicht allein der Arsengehalt dieses Staubes oder aber seine gefährliche mikroskopisch-morphologische Beschaffenheit, sondern Beides zusammen.

„Beim Fressen in die Luftröhre gelangt, erzeugt dieser Staub Catarrh, käsige Pneumonie und aus dieser später Tuberkulose.

Zu dieser meiner Ansicht, mit der ich glaube, der Wahrheit nahe zu kommen, brachten mich folgende Erwägungen:

1. Der Gesteinstaub enthält die schädigende Ursache; dies erhellt aus den gesammelten mitgetheilten Erfahrungen und Betrachtungen.

2. Dem im Staube enthaltenen Arsenik kann aus den oben angeführten Gründen die Schuld nicht beigemessen werden, ebenfowenig spricht irgend eine Erfahrung dafür, daß die verletzenden mechanischen Eigenschaften des Gesteinstaubes eine maligne Neubildung hervorzurufen im Stande seien.

3. Bei der Combination aber beider Noxen, des mechanisch reizenden Staubes und des chemisch differenten Stoffes, fallen erstens die in den beiden vorhergegangenen Abschnitten gemachten Einwendungen weg, und dann läßt sich eine Einwirkung in dem perniciosen Sinne auch aprioristisch construiren:

Bei der *tabes arsenicalis* ist die aufgenommene Arsenikmenge zu groß, um nur einen permanenten Reiz zu setzen, sie vergiftet allgemein und zerstört local; in unterm Falle aber ist die Menge wieder zu gering, um irgendwelche Wirkung, sei sie nur auch in dem verlangten irritativem Sinne hervorzurufen. Das Gift wird zum größten Theil wieder expektorirt resp. zu einem sehr geringen Theile von der Auskleidung des Respirationstractus reforbirt und wieder ausgeschieden, die an sich gesunden Bronchialdrüsen haben nach den bekannten Thierexperimenten nur Veranlassung corpusculäre Elemente aufzuhalten, nicht aber die lösl. Arsenverbindung. Sind jedoch in Folge der Inhalation von Staub und besonders von dergleichen scharfen Staub (unter dem Mikroscope „makroskopische Glascherben“) die Epithelüberzüge an unzähligen Stellen verletzt, so wird jetzt eine größere Menge des inhalirten Arsens aufgenommen werden müssen, und was früher nicht genügte, das genügt jetzt; sind ferner durch die Inhalation des betreffenden Staubes die Bronchialdrüsen in einen chron. Entzündungszustand übergegangen, so findet jetzt das Arsen an der gereizten und in

ihrer Thätigkeit gestörten Drüse Gelegenheit, seine deletäre Wirkung auszuüben, nicht sowohl in seiner Eigenschaft als spezifisch toxischer Stoff, sondern insofern es als chemisch differenter Körper den gegebenen Reizzustand dauernd zu erhalten im Stand ist.

Wenn ich nun endlich die aus diesen Betrachtungen gewonnene Ansicht, die natürlich nicht mehr als eine Hypothese, die einer andern gegenüber steht, sein soll, zu dem oben festgestellten pathologisch-anatomischen Befund hinzufüge, so ergibt sich für mich folgendes Schlusresultat:

Die Bergkrankheit in den Schneeberger Gruben, der sog. Lungenkrebs ist ein primäres Lymphosarkom (resp. Lymphosarkoma fibromatodes) der Bronchialdrüsen welches seine Entstehung der permanenten Einwirkung eines Reizes verdankt, der zu gleicher Zeit mechanischer und chemischer Natur ist.

Schließlich erlaube ich mir, meinen hochverehrten Lehrer, dem Herrn Prof. Dr. C. Bollinger für die große Aufmerksamkeit und freundliche Unterstützung, welche er mir während meiner Studienzeit und zuletzt wieder bei dieser meiner Arbeit zu Theil werden liefs, meinen ergebensten Dank auszusprechen.

Erklärung der Tafel:

Das Präparat ist mit wässerigem Haematoxylin gefärbt, in Nelkenöl aufgehellt und in Canadabalsam eingelegt worden.

Die Vergrössung ist Hartnack-System IV. Okular 3 bei halbausgezogenem Tubus.

Es ist eine Stelle der Geschwulst eingestellt, an welcher ihr an verschiedenen Punkten ziemlich variirender Bau auf einem Gesichtsfeld zu überblicken ist:

a ein Gerüstbalken von fast ganz bindegewebigen Bau.

b ein Gerüstbalken, der vorwiegend aus Spindelzellen besteht.

c Uebergangsform von dem bindegewebigen zum sarkomatösen Charakter.

d, e, f Alveolen, alle mit dichtaneinander liegenden Rundzellen gefüllt, die sämtlich gut gefärbt erscheinen.

Das feine Reticulum, welches diese Rundzellen in ihren Alveolen erhält, ist bei der angewandten Vergrößerung nicht zu sehen.



